

Узрок сушењу пупољака није време, т.ј. пролећни мразеви како се обично мисли, већ нарочита буба чије је име *крушков жижак* или *пипа*.

У зараженим пупољцима изгрижено је срце, а током априла у њима се још може наћи тром црвић ваљкастог тела и прљаве беле боје с мрком главом. Он се претвара у малу луткицу, а ова у малу, мрко сиву бубу са дугом рилицом, која затим напушта пупољак кроз округласти отвор.

Већ ујесен буба снесе своја јаја у пупољке а ларвице, које се из њих испиле, изједу их и униште до априла идуће године.

Против штеточине много је што шта препоручивано, али изгледа да има успеха само скупљање и уништавање заражених пупољака с пролећа. На великим воћкама и у великим воћњацима ово је неизводљиво, али код ниских, патуљастих воћака постиже се врло добар успех. Са скупљањем треба почети рано чим здрави пупољци крену. Све



Сл. 7. — Крушков жижак или пипа: 1 угинули пупољци; 2, 3 и 4 ларве (црвићи), луткица и одрасла буба јако увеличани.

пупољке који остају тада неразвијени, а сем тога постају и све више мркожути, треба покупити и уништити не чекајући да штеточине у њима одрасту и напусте их. Оваквим трепљењем, у току две—три године, штеточина се може уништити, нарочито ако и суседи поступе на исти начин.

Др. П. Вукасовић

### Облици потрошње плодова шљива код нас

Као што је познато код нас се од воћних плодова највише добијају плодови шљива, јер је и број шљивових садница по воћњацима несразмерно већи од броја осталих воћака. Тако према последњој статистици за територију Дунавске бановине, број шљивових стабала износи 9154000 комада, према 4442000 комада за све остале воћке. У процентима изражено долази на шљиве 67.3 а на остало воће 32.7

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

WWW.UNILIB.RS

